

Betegájékoztató: Információ a felhasználó számára

B₁₂-vitamin Ankermann 1000 mikrogramm bevont tabletta

cianokobalamin (B₁₂-vitamin)

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.
- Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a B₁₂-vitamin Ankermann 1000 mikrogramm bevont tabletta (a továbbiakban B₁₂-vitamin Ankermann tabletta) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a B₁₂-vitamin Ankermann tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a B₁₂-vitamin Ankermann tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A B₁₂-vitamin Ankermann tabletta cianokobalamin tartalmú, amely B₁₂-vitaminként ismert, és a B₁₂-vitaminhiány kezelésére használják, különösen olyan betegeknek akik

- szigorúan vegetáriánusok vagy vegán étrenden élnek
- B₁₂-vitamin felszívódási zavaruk van.

A legtöbb ember elegendő B₁₂-vitaminhoz jut a táplálékból, de ha Ön gyomor- vagy bélműtéten esett át vagy bizonyos gyomor-bélbetegségei vannak, (gyomorhurut, cöliákia), vagy étel-kobalamin felszívódási zavara van, lehet, hogy Önnél nem szívódik fel elegendő mennyiségű B₁₂-vitamin.

A B₁₂-vitaminhiány kialakulásának rizikója a korral és szigorú vegetáriánus vagy vegán étrend esetén megnőhet.

B₁₂-vitaminhiány következtében az alábbi kórképek fordulhatnak elő:

- vérbizonyos zavarok, bizonyos típusú vérszegénység, azaz (anémia: csökken a vörösvértestek száma)
- idegrendszeri betegségek, (a gerincvelő megbetegedése)
- egyéb B₁₂-vitaminhiánnyal összefüggő betegségek

A B₁₂-vitaminhiány korai tünetei a fáradtság és sápadtság, a kezek és lábak bizsergése, bizonytalan járás és a csökkent fizikai erő. Előfordulhatnak egyéb idegrendszeri tünetek, mint pl. a kezek vagy lábak égő érzése, zsibbadása vagy fájdalma, továbbá izomgyengeség, zavartság és az ítélőképesség károsodása.

A B₁₂-vitaminhiány tünetek nélkül is előfordulhat és éveken át tarthat mielőtt a beteg egészsége romlana.

2. Tudnivalók a B₁₂-vitamin Ankermann tablettá szedése előtt

Ne szedje a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát ha:

- allergiás a cianokobalaminra vagy a B₁₂-vitaminra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére
- dohányzás okozta látásromlásban (dohányzás okozta ambliopia) vagy látóideg gyulladásban (retrobulbáris neuritisz) szenved, mely a csökkent vörösvértestszám következménye (anémia pernicioza)
- fennáll Önnél egy bizonyos szembetegség kockázata (Leber-féle optikus atrófia)

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Ha folsav hiánya is van, ez gyengítheti a terápiára adott válaszát. Ebben az esetben, konzultáljon orvosával a B₁₂-vitamin Ankermann tablettá alkalmazása előtt, mivel kiegészítő intézkedések és egészségügyi megfigyelés lehetnek szükségesek.

Az erős dohányzás inaktíválja a B₁₂-vitamint.

A B₁₂-vitamin egyik hatása a megnövekedett vörösvértestképzés, mely fokozza a szervezet káliumigényét. A súlyos B₁₂-vitaminhiány (vérszegénységgel) intenzív kezelése hypokalaemiahoz és hirtelen halálhoz vezethet.

A B₁₂-vitamin Ankermann tablettát nem szabad orvossal történő konzultáció nélkül 3 hónapnál több ideig folyamatosan szedni. Ha úgy érzi, hogy további cianokobalamin pótlásra lehet szüksége, kérjük konzultáljon orvossal, hogy beütemezze a szükséges érvizsgálatot.

Egyéb gyógyszerek és a B₁₂-vitamin Ankermann tablettá

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket is.

A B₁₂-vitamin Ankermann tablettá hatását az alábbi gyógyszerek befolyásolhatják:

- Protonpumpa-gátlók (pl. omeprazol) és hisztamin H₂-antagonisták (pl. cimetidin), mindkettőt a fokozott gyomorsav termelődés kezelésére alkalmazzák, amely emésztési zavart vagy fekélyt okoz.
- Kolchicin, köszvény kezelésére alkalmazzák
- Neomicin és klóramfenikol, melyek antibiotikumok
- Biguanidok, pl. a metformin, melyet cukorbetegségben használnak
- Aminoszalicilsav, melyet gyulladásos bélbetegségek kezelésére alkalmaznak
- Szájon át szedhető fogamzásgátlók
- Glükokortikoidok pl. prednizolon, melyet gyulladás kezelésére használnak
- Kolesztiramin, melyet a vér koleszterin (zsír) szintjének csökkentésére használnak
- Kálium-klorid, melyet a káliumhiány korrekciójára használnak
- Metildopa, melyet magas vérnyomás kezelésére használnak
- Második generációs antipszichotikumok (pl. olanzapin és riszperidon)

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A B₁₂-vitamin Ankermann tablettá nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

A B₁₂-vitamin Ankermann tablettá tejcukrot (laktóz), szacharózt és nátriumot tartalmaz.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.
A készítmény kevesebb, mint 1 mmol (23 mg) nátriumot tartalmaz adagolási egységenként, azaz gyakorlatilag „nátriummentes”.

3. Hogyan kell szedni a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A B₁₂-vitamin Ankermann tablettát egészben kell lenyelni elegendő mennyiségű vízzel, lehetőleg reggel, éhgyomorral.

Alkalmazása felnőtteknél

Az ajánlott napi adag 1 tablettát B₁₂-vitamin Ankermann tablettát. Ez 1000 mikrogramm cianokobalaminnak felel meg naponta.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

Gyermekeknél és serdülőknél legfeljebb napi 1000 mikrogramm cianokobalamint ajánlott szájon át a B₁₂-vitaminhiány injekciós kezelésének alternatívájaként.

A B₁₂-vitamin Ankermann 1000 mikrogramm tablettát 6 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem ajánlott. Csak 6 éves és annál idősebb gyermekeknek akkor ajánlott, amennyiben a gyermek a tablettát szétrágás nélkül le tudja nyelni.

Alkalmazása idős betegeknek

A felnőtteknél leírt adagolás érvényes.

Ha veseproblémája van

Konzultáljon orvosával a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát szedését megelőzően, ha vesekárosodása van.

Ha májproblémája van

Nem ismert, hogy biztonságosan szedheti-e ezt a gyógyszert, ha májproblémái vannak. Konzultáljon orvosával a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát szedését megelőzően, ha májkárosodása van.

Ha az előírtnál több B₁₂-vitamin Ankermann tablettát vett be

Ha az előírtnál több B₁₂-vitamin Ankermann tablettát vett be, beszéljen kezelőorvosával, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Nem jelentettek mérgezéses esetet.

Nem ismert a túladagolás ellenszere. Túladagolás esetén el kell kezdeni a tüneti kezelést.

Ha elfelejtette bevenni a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát

Ha elfelejtett bevenni egy adagot, azonnal tegye ezt meg, ha csak nincs itt az ideje a következő adag bevitelének. Ha ez történt, ne vegye be az elfelejtett adagot, de vegye be a szokásos adagját a helyes időben. Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha idő előtt abbahagyja a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát szedését

A készítmény szedésének abbahagyása a B₁₂-vitaminhiány elégtelen pótlását eredményezheti. Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Az alábbi mellékhatásokat általában a B₁₂-vitamin injekciós alkalmazása során jegyezték fel:

Nem gyakori: 100 betegből legfeljebb 1 embert érinthet

- Súlyos túlérzékenységi reakciók, amelyek csalánkiütés, a test nagyobb területeinek bőrkiütése vagy viszketés formájában jelentkeznek.

Nem ismert (a gyakoriság nem állapítható meg a rendelkezésre álló adatokból):

- Acne-szerű, hólyagos kiütések
- Láz

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnek bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben található elérhetőségeken keresztül](#).

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a B₁₂-vitamin Ankermann tablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:/Felh.:) után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a B₁₂-vitamin Ankermann tablettá?

Hatóanyag:

1000 mikrogramm cianokobalamin (a B₁₂-vitamin szintetikus formája).

Egyéb összetevők:

povidon (K 30), sztearinsav, montán glikol viasz, laktóz-monohidrát, szacharóz, gumiarábikum, talkum, kalcium-karbonát, titán-dioxid (E171), kaolin, makrogol 6000, makrogol-glicerinhidroxisztearát, nátrium-lauril-szulfát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, hidroxipropil-cellulóz, telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek.

Milyen a B₁₂-vitamin Ankermann tablettá külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Kerek, mindkét oldalán domború, fehér bevont tablettá.

10 db, 50 db vagy 100 db bevont tablettá átlátszó PVC/PVDC//Al buborékcsomagolásban és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó**A forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG
71034 Böblingen
Calwer Str.7.
Németország

Gyártó:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG
29439 Lüchow
Wendlandstraße 1.
Németország

B₁₂-vitamin Ankermann 1000 mikrogramm bevont tableta
OGYI-T-23385/01 10×

B₁₂-vitamin Ankermann 1000 mikrogramm bevont tableta
OGYI-T-23385/02 50×

B₁₂-vitamin Ankermann 1000 mikrogramm bevont tableta
OGYI-T-23385/03 100×

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2020. május